PARALISIA OBSTÉTRICA DO PLEXO BRAQUIAL

Fig. 04

GENERALIDADES :

A paralisia obstétrica(po) é definida como uma paralisia flácida(parcial ou total) do MMSS secundário á uma lesão do plexo braquial causada pelas manobras do parto. A incidência e gravidade vem diminuindo ao longo tempo devido ao aperfeiçoamento dos cuidados obstétricos.

A recuperação completa só acontece quando bíceps e deltóide começam a contrair até o 2º mês de vida.Quando acontece até o 3º mês e meio, a recuperação era incompleta.Se não houver recuperação até o 3º mês,ele aconselha a exploração cirúrgica do plexo braquial.

EPIDEMIOLOGIA E ETIOLOGIA

0,1 A 0,4% partos

Fatores de risco – macrossomia fetal,feto de alto peso,distocia do ombro,baixa estatura materna,diabetes gestacional,uso de fórceps e apresentação podálica.

Maior incidência em múltiparas sendo o fator de risco mais importante - >4000mg

Predominância pelo lado direito – relacionada a apresentação OEA – mais comum onde predispõe o choque do ombro D contra o púbis da mãe.

Etiologia - traumática por estiramento forçado de um ou mais componentes do plexo braquial por tração :

- apresentação pélvica :a cabeça é extraída por forte flexão lateral no tronco e no pescoço lesando o plexo

- apresentação em vértice : os ombros são liberados através da flexão lateral forçada da cabeça e pescoço
- fórceps : pode contudir diretamente o plexo braquial.

Estudos comprovaram que a maioria das rupturas ocorrem no plexo inferior (mais frágil que o plexo superior) e á nível do forame ou dentro do sulco do processo transverso. A avulsão das raízes nervosas à nível da medula frequentemente cursa com lesão do neurônio motor superior

Classificação de Seddon

Neuropraxia de Seddon - A estrutura do nervo permanece intacta, porém a condução axonal está interrompida.Há perda temporária da função motora e permanência da propriocepção,tato,vibração e sudorese.Não há degeneração Walleriana.

Axoniotmese de Seddon – interrompe o axônio mas as bainhas permanecem intactas.Surge a degeneração Walleriana com parada da função motora,sensitiva .Ocorre regeneração variável orientada pela preservação do endoneuro.O tempo de recuperação depende da distância da lesão aos efetores.

Neurotmese – determina lesão total do nervo com destruição das estruturas internas.

Classificação de Suderland :

Grau I – neuropraxia de Sedon

Grau II – axoniotmese - degeneração do axônio.O epineuro está sempre preservado

Grau III – acomete a fibra(lesão axônio + endoneuro)

Grau IV – acomete o fascículo(axônio+endoneuro+ perineuro)

Grau V (Neurotmese de Seddon) – axônio+endoneuro+perineuro+epineuro- tudo lesado

Classificação de Narakas

- **Grupo I** – C5-6: neuroapraxia/axoniotmese
- **Grupo II** – C5-7: com lesões variáveis entre neuroapraxia e neurotmese parcial
- **Grupo III** – C5-T1: sem S. Horner. Neurotmese ou rotura C5-C6
- **Grupo IV** – C5-T1: com S. Horner. Neurotmese ou avulsão C8-T1 e roturas variáveis ou avulsões C5-C6

Narakas. Surgical treatment of traction injuries of the brachial plexus. Clin.Orthop.133:71-76. 1978

Gravidade da Lesão :

-Lesões Leves : estiramento de fibras nervosas + edema perineural + hemorragia . Ocorre uma recuperação completa com a absorção do edema.

-Lesões Moderadas : estiramento + arrancamento + hemorragia intra e extra neural. A recuperação na maioria das vezes é lenta e incompleta devido à lesão por arrancamento .

- Lesões Graves : ruptura completa dos troncos do plexo ou uma avulsão real das raízes da medula espinal. Neste tipo a recuperação é muito ruim.

Nível da Lesão :

- **Paralisia alta ou Erb-Duchenne(75%)** :C5,C6 e C7.Na lesão C5-C6 isolada,a criança apresenta paralisia flácida do membro superior com ombro em rotação interna e adução;cotovelo em extensão e antebraço pronado.Quando solicitados para levar a mão a boca ,observamos o **sinal clássico do corneteiro**.Quando C7 acometida,associado punho e dedos fletidos(agravante).

As p.altas são mais freqüentes e com melhor chance de recuperação espontânea.

Ocorre comprometimento dos músculos , deltóide ; manguito rotador ; bíceps ; supinador e braquiorradial ,o que mantém o braço em rotação interna e pronação. Os dedos e punhos possuem uma mobilidade ativa normal(Sem C7 envolvido) .

Criança nasceu por **apresentação cefálica** - A lesão costuma ser Sunderland I e II do tronco superior.Recuperação total em 90% casos

Criança nasceu por **apresentação pélvica** – pode ter havido avulsão de C5-C6 com escápula alada e 2/3 casos paralisia do n.frênico

Outra variedade da paralisia alta é a **associada a lesão de C7**.Neste caso C5 e C6 estão em Suderland II ou III.O cotovelo pode estar ligeiramente fletido e paralisia total ou parcial da extensão de dedos e punho.**Moro – e preensão +.**

- **Paralisia baixa ou Klumpke** (raro,1%) :Acomete as raízes C8 e T1.Há deficiência motora e sensitiva da mão com ombro e cotovelo preservando mobilidade ativa.Provavelmente corresponde a uma lesão total que recuperou completamente a parte alta.

Ocorre comprometimento dos flexores longos dos dedos e músculos intrínsecos da mão c/ **Moro + e preensão - .**

A presença da **síndrome de Horner** ipsilateral (miose , ptose e enoftalmia)e / ou paralisia dos músculos paraescapulares

(escápula alada,paralisia do manguito,elevação do diafragma) indicam a presença de lesão das raízes antes de formar os troncos do plexo braquial (lesão pré-ganglionar) .

- **Paralisia Total do Braço(24%)** : Lesão de C5,C6,C7,C8 e T1.A criança apresenta paralisia flácida de todo o membro, inclusive mão.As raízes superiores são lesadas primeiro e raramente por avulsão.As inferiores sempre lesadas por avulsão.A recuperação espontânea é frequentemente incompleta. Não há tônus muscular ,sem sensibilidade c/ reflexo de preensão - e mão em garra.

Há 2 apresentações clínicas:

- A) **Sem S. Claude-Bernard-Horner.**Moro é assimétrico e preensão ausente. Recuperação rápida da flexão dos dedos e m.intrínseca da mão→pós-ganglionar
- B) **Com Síndrome de Claude-Bernard-Horner** – A lesão mais freqüente é uma ruptura de C5,C6,C7 e avulsão de C8 e T1 .Mesmo que o ombro e cotovelo se recuperem , a recuperação da mão é péssima.
- C) **Deformidades residuais é mais comum** - ombro,cotovelo,antebraço e mão

Quadro 2-2. Avaliação motora e sensitiva das raízes cervicais do plexo braquial

Raízes envolvidas	Músculos afetados	Perda funcional	Perda sensorial
C5; C6 (Paralisia de Erb)	Deltóide, supra-espinal, infra-espinal, bíceps braquial, coracobraquial, braquiorradial, extensores longo/curto do carpo* e peitoral maior	Ombro: rotação externa, abdução e flexão Cotovelo: flexão Punho: extensão*	Dorso do polegar e indicador
C5; C6; C7 (Paralisia de Erb)	Todos acima descritos + triceps, flexor radial do carpo, extensores longo e curto do polegar e abductor do polegar	Ombro: rotação externa, abdução e flexão Cotovelo: extensão e flexão Punho e dedos: extensão	Face volar e dorsal do polegar, indicador e médio
C7; C8; T1 (Paralisia de Klumpke)	Extensores/flexores do punho, flexores superficiais/profundos dos dedos, lumbricais, interósseos dorsais e palmares, musculatura tenar e hipotenar	Punho: extensão e flexão Dedos: extensão, flexão, adução e abdução	Face volar e dorsal do anular e mínimo
C5-T1 (Paralisia total)	Todos os músculos do membro superior	Paralisia total do membro superior	Anestesia completa**

*Pode ou não estar presente.

**Exceto na face interna do braço que é suprida também pela raiz de T2.

QUADRO CLÍNICO :

Diagnóstico essencialmente clínico(exame neurológico no berçário).Alguns autores recomendam aguardar 3 semanas.Membro acometido flácido e pode ser doloroso a manipulação, sem movimento ao lado do tronco com o cotovelo em extensão. É necessário ressaltar sobre 02 reflexos(testes provocativos usados para a indução flexão do cotovelo e extensão de dedos e punho) e ausência ou presença da síndrome de Horner .Outros sinais como a elevação do diafragma(n.frênico),escapula alada(n.torácico longo),paralisia do manguito(n.supra-escapula),...indicam lesão pré-glanglionar(avulsão) :

A) **Reflexo de Moro(abraço)** consiste em : manter o pcte em decúbito dorsal + abdução e extensão dos MMII E MMSS. Após isto estimula-se o paciente com a extensão do pescoço(existem várias maneiras e uma delas é elevar o bebê acima da mesa segurando suas mãos em seguida libera-as rapidamente) e o reflexo será abdução e extensão dos MMII e MMSS + extensão dos dedos(em leque) + flexão das falanges distais do 1º e 2º quirodáctilo. Em seguida ocorre flexão e adução do MMSS semelhante á um abraço .

B) **Reflexo de preensão** corresponde á um dedo ou lápis colocado pela bordo ulnar da palma da mão estimulando o tono flexor e os dedos agarrarão o objeto ; se tentar puxar ela aumentará o tonus da flexão dos dedos podendo ser suspenso c/ o objeto que está segurando .

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:

- Pseudoparalisia por fratura de clavícula e úmero proximal – ocorre compressão nervosa pelos fragmentos fraturados ou imobilização inadequada.
- Aplasia congênita das raízes do plexo braquial – muito rara e diagnosticada durante o ato cirúrgico
- Infecção do ombro (pioartrite) em um RN – exames laboratoriais mostram a infecção
- Varicela congênita do membro superior – lesão do gânglio dorsal da raiz nervosa e corno anterior do cordão espinhal,levando a déficits sensitivos e atrofias musculares.Habitualmente ocorre necrose cutânea do membro.
- Paralisia cerebral – diferenciação é fácil – espástica enquanto a paralisia obstétrica é flácida.No 1º exame no berçário, avaliar os mmii para esta diferenciação.
- Compressão intra-uterina por banda de constrição ou cordão umbilical – a manifestação mais comum é uma paralisia alta do n.radial,o ombro está normal.
- Síndrome de deformação no útero bicorno – P.Osbétrica não relacionada a t.parto
- Paralisia por má adaptação uterina

Propedêutica armada – O diagnóstico é clínico, mas podemos utilizar alguns exames para o diagnóstico diferencial ou melhor visualização da lesão:

- Radiografia simples ombro e tórax – afastar fraturas de clavícula e colo úmero
- Mielografia– distinguir avulsões de rupturas extraforaminais. A mielografia pode ser usada na 3ª semana de vida podendo diferenciar avulsões entre completas e incompletas e mielomeningocele. Alta % de falso negativo.
- Mielotomografia computadorizada – visualiza raízes e sua fixação.
- RM – permite definir o nível da lesão, mas não permite visualizar avulsões.
- Eletroneuromiografia – após 3 meses da lesão. Em geral poucas fibras são suficientes para gerar potenciais de ação, o que fornece muita esperança aos pais, porém um bom prognóstico surge quando esses potenciais conseguem mover o bíceps. **Este exame tem pouco valor pré op mas útil no pós.**

Devido as implicações legais que esta patologia apresenta, é fundamental o registro das diversas fases. Uma ficha foi criada para o acompanhamento e tem avaliação quinzenal, se boa recuperação passa a ser mensal até o 6º mês

Avaliação funcional de Mallet

Prognóstico – regressão espontânea entre 40-80% casos em no máximo 18m.

Mau prognóstico – 1-sem recuperação bíceps após 3m com força grau III

2-S.Horner

Tabela 31-4 Classificação e Prognóstico em Paralisia Obstétrica

	Quadro Clínico	Recuperação
Tipo I	C5-6	Completa ou quase completa em 1-8 semanas
Tipo II	C5-6	Flexão do cotovelo: 1-4 semanas Extensão do cotovelo: 1-8 semanas
Tipo III	C7	Ombro limitado: 6-30 semanas
	C5-6	Ombro sofrível: 10-40 semanas Flexão do cotovelo: 16-40 semanas Extensão do cotovelo: 16-20 semanas Punho: 40-60 semanas
Tipo IV	C8-T1 (sem sinal de Horner)	Mão completa: 1-3 semanas
	C5-7	Ombro sofrível: 10-40 semanas Flexão do cotovelo: 16-40 semanas Extensão do cotovelo incompleta, sofrível: 20-60 semanas sem recuperação
	C8	Punho: 40-60 semanas
Tipo V	T1 (sinal de Horner temporário)	Mão completa: 20-60 semanas
	C5-7	Ombro e cotovelo, conforme acima
	C7	
	C8	Punho sofrível ou apenas extensão; flexão sofrível ou ausência de flexão
	T1	
	C8-T1 (sinal de Horner geralmente presente)	Mão bastante sofrível com ou sem flexores e extensores fracos; ausência de intrínsecos

Modificada de Narakas AO. Em Bora FW Jr, ed: *The pediatric upper extremity: diagnosis and management*, Philadelphia, 1986, WB Saunders.

A escala de Toronto é usada para prever resultados negativos baseados quando não são efetuados enxertos ou reparos cirúrgicos. Consiste na pontuação da flexão do cotovelo, extensão do cotovelo, punho, dedos e polegar. Estes grupos musculares são pontuados como:

- 0 – ausência de movimentos
- 1 – mov limitados
- 2 – mov normais

Uma pontuação máx de 12. Pontuação < 3,5 previa resultado satisfatório.

TRATAMENTO :

A) **Conservador :**

Paralisia de Erb - Nos 1os 3 meses (período de observação) o tto conservador é instituído. Até a 2ª ou 3ª semana enquanto o hematoma persiste em torno do plexo, o membro superior deve ser mantido em repouso com enfaixamento junto ao tórax.

Imob gessada ou gesso em posição de “estátua da liberdade ou esgrimista” estão proscritos – provocam contratura em rot externa e lux inferior.

Tratamento dinâmico inicia na 3ª semana com manipulação articular do ombro e cotovelo, pelos pais orientado por fisioterapeuta.

- O ombro paralisado deve ser movimentado em abdução e rotação externa e estabilizando a art escapulotorácica em neutro. O cotovelo deve ser mobilizado em prono-supinação e flexo-extensão.

- *Movimentar cada junta 10 vezes a cada 3-4 vezes ao dia em seu arco total de movimento. O objetivo é prevenir contraturas durante a recuperação espontânea durante os primeiros meses como em rotação interna e adução do braço devido a recuperação do m. subescapular e peitorais, antes dos rotadores externos, assim como a contratura em pronação do antebraço que ocorre nas paralisias altas.*

Em crianças > 2 anos , o tto depende do tipo de acometimento e gravidade. Deve-se pensar em cirurgia. Nesta faixa, o paciente prefere usar a mão normal e ignorar a comprometida. Importante programa de terapia ocupacional para a criança não ignorar o membro.
A fisioterapia deve prosseguir até a maturidade esquelética, salvo se recuperação completa.

Eletroterapia - Estimulação elétrica é controversa, mas sabe-se que se não estimular o plexo após 2 anos de desinervação nada restará de recuperação. A estimulação de pulso rápido tem sido utilizada para 3 propósitos:

- *Aumentar a força dos m. desinervados*
- *Bombardear os centros de retorno musculocutâneo contribuindo para a percepção muscular e sensorial*
- *Reduzir a dor*

Paralisia total – O cuidado é o mesmo. Prevenir com maior atenção a contratura em supinação (maior limitação) da membr. interóssea através de manipulação em pronação e supinação do antebraço e com cuidado para não luxar a cabeça do rádio ou da ulna. Podem ser usadas órteses de punho e dedos.

B) Cirúrgico :

Indicações: Ausência de recuperação do bíceps (até 3m)
Escala de Toronto < 3,5
Plexopatia total com S. Horner

Alguns autores aguardam 6m e outros também avaliam o deltóide.

O tto cirúrgico compreende 2 modalidades:

Cirurgia primária - Reparação direta da estrutura neural lesada – microcirurgia

- **Neurólises** internas e externas – raiz íntegra envolta por tecido cicatricial (liberação da raiz)

- **Enxerto de nervo** - n.sural, cutâneo medial do antebraço e n.ulnar.Quando coto proximal viável – lesões extraforaminais.

- **Neurorrafias** (suturas) – lesões extraforaminais
- Transferências de nervo ou **neurotização** int ou ext – lesões intraforaminais.Quando raiz avulsionada da medula ou coto proximal não viável.Usa outro nervo para comandar o músculo reinervado

Neurotizações:

– Vantagens :

- A parte proximal do nervo doador é viável.
- A reinervação ocorre mais rapidamente pois leva-se a parte doadora o mais próximo possível do órgão efetor.

– Desvantagens:

- Poucos nervos podem funcionar como doadores.
- Perda parcial da função exercida pelo nervo doador que deve ser aceitável.

A idade máxima que o paciente de beneficia é de 1,5 a 2 anos.Após esta época o tto se dirige as seqüelas.Época ideal – 1-6m.

Cirurgias secundárias - Atuação nas seqüelas decorrentes da disfunção muscular

- Transferências musculares
- osteotomias

Acesso ao plexo :

Posicionamento do paciente – decúbito dorsal,coxim entre as espátulas com cabeça virada para o outro lado a lesão.Prepara ambos os mmii para a retirada do n.surais.Abordagem supraclavicular clássica em “L” (acompanhando a borda posterior do esternocleidomastóideo até a clavícula,seguido lateral a esta até atingir a região deltopeitoral ou incisão de Borrero(transversa).A

reparação nervosa é feita com fios de nylon 9.0 ou 10.0 e /ou cola de fibrina.O achado crúrgico geralmente é um neuroma entre C5-C6 e tronco superior sem organização fascicular,devendo ser ressecado e substituído por enxerto de sural..C7 quando atingida costuma estar avulsionada.

Estimulação elétrica transoperatória costuma ser útil.

Ao término, o paciente é imobilizado com gesso tipo concha imobilizando simultaneamente cabeça,membro superior ,braço ao longo do corpo e cotovelo <90º .A recuperação nervosa é lenta e resultados podem ser encontrados à partir do 8º mês pós op estendendo-se até 2-4 anos

Avulsões de C5-C6 costumam ser tratadas com transferência de nervo..Não fazer transferência do n.frênico na criança – i.respiratoria aguda.O n.espinhal acessório pode ser usado desde que se faça a ressecção após emissão do seu 1º ramo no trapézio.

Técnica de Oberlim – utiliza um grupo fascicular do ulnar(para a flexão do punho) para o bíceps pela coaptação direta pelo musculocutâneo.

Nervo ulnar:

– Para lesões por avulsão do tronco superior, tem sido proposta a transferência de parte do nervo ulnar para os ramos do músculo-cutâneo para o bíceps, sem aparente déficit para o ulnar.

– Oberlin, Béal, Dauge 1994
J.H.S.

Técnica de Berteli – transferência direta do ramo motor do radial para cabeça longa do tríceps neurotizado para o n.axilar(m.deltóide).

Lesões totais sem recuperação até o mês 3 – cirurgia se Síndrome de Claude – Bernard –Horner – neste caso se prepara ms ipsilateral,cervical,mmii e ms contralateral ,cervical e hemitórax para enxerto de n.intercostais e raiz de C7 contralateral.

Avulsões de C7-C8 e T1- maior índice de avulsão:As opções de transferência são os intercostais T3-T6 com ou sem interposição de enxerto ou transferência de C7 contralateral.,que tem mais fibras motoras que a divisão anterior.,usada com interposição de enxerto do n.sural em vez do ulnar vascularizado

Enxertos são colocados internamente ao epineuro externo,intimidade do epineuro interno e fascículos sem preocupação com coaptação interna.Pontos de sutura são colocados no epineuro do enxerto e no epineuro do tronco receptor ressecado de forma parcial.

Cirurgias secundárias – tto das seqüelas – Geralmente após 2 anos de idade.Tratar apenas as seqüelas que prejudiquem a função.

Ombro : O tto das lesões do ombro só se justificam se tiver uma boa função da mão.As deformidades estão ligadas ao desequilíbrio muscular onde o subescapular que á o m. mais potente do manguito é rot interno inervado por C7-C8.Nas lesões C5,C6 e +-C7,é em geral ativo.Ocorre deformidade em rot interna.Clinicamente manifesta-se por adução do cotovelo e limitação da rot ext passiva.(peitoral maior,grande dorsal e redondo maior podem estar envolvidos.A cavidade glenóide sofre altrações tornando-se rasa e com tendência a subluxação e lux posterior.A tração de t.conjunto leva ao alongamento da coracóide,ocupando espaço anterior da glenóide.Cirurgias para alongamento de partes moles e transferências musculares.

- Sever
- L'Episcopo
- Zachary
- Hoffer

Waters classificou a deformidade glenoidal em 7 tipos baseado em TC e RM:

Operação de Sever- L'Episcopo – Quando feito antes dos 6 anos de idade,o procedimento de Sever LÉpiscopo modificado por Green melhora a rotação lateral do ombro mediante transferência do redondo maior para a porção póstero-lateral do úmero,o mais próximo da borda lateral do tríceps.Sempre precedido

<http://traumatologiaeortopedia.com.br>
<http://www.traumatologiaeortopedia.com>

Tabela 31-5 Classificação da Deformidade Glenoumeral em Casos de Paralisias Obstétricas Crônicas do Plexo Braquial com Base nos Achados de Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética (TC/RM)

Tipo	Achados da TC/RM
I	Articulação glenoumeral normal
II	Hipoplasia mínima da cavidade glenóide (aumento de >5° de retroversão)
III	Subluxação posterior da cabeça do úmero
IV	Desenvolvimento de uma falsa cavidade glenóide
V	Achatamento posterior da cabeça do úmero
VI	Luxação infantil
VII	Interrupção do crescimento da cabeça do úmero

De Waters PM: The upper limb. Em Morrissy RT, Weinstein SL, eds. *Lovell and Winter's pediatric orthopaedics*, Philadelphia, 2001, Lippincott Williams & Wilkins.

da cirurgia de Sever(tenotomia do subescapular e peitoral maior).Exige congruência da cabeça umeral.

No pós op – exercícios iniciados 3 sem após procedimento para abdução, rot lateral, adução e rot medial. Enfatizar a função dos m. transferidos. Quando o braço aduzir satisfatoriamente, tipóia de dia e gesso bivalvado a noite. Suporte noturno por mais de 3-6m. Exercícios durante muitos meses ou anos para manter a mobilidade e força muscular

Zachary – modificação na técnica de L'Episcopo – Transferência do grande dorsal junto com o redondo maior.

Hoffer – modificou a técnica de Zachary realizando tenotomia do peitoral maior e transferência do redondo maior e grande dorsal para o manguito.. Feita uma dupla via (ant e post) com cuidado para não lesar o n. axilar. Pós op gesso por 8 sem.

Após esses procedimentos, permanecendo a rot interna – **osteotomia de rot externa do úmero**. É condição essencial que não exista luxação ou subluxação do ombro. Rodar 45° de modo que ainda reste 45° de rot int e fixa com placa. pós op – abdução de 40°, cotovelo em flexão de 90° e antebraço supinado + gesso toracobraquial por 8-12 sem.

Zancolli classifica e descreve o tto cirúrgico baseado em sua experiência – protocolo

Classificação geral de Zancolli:

- *Tipo proximal*: 53% de todos os casos de seqüela do membro superior (43% lesão inicial C5 e C6 e 10% C5, C6 e C7)
- *Tipo distal*: paralisia completa de todo o plexo (C5 a T1), mas com o déficit principal ao nível do antebraço e da mão
- *Apresentação clínica usual*: membro superior com rotação interna e moderada abdução do ombro (72% dos casos). Contratura em flexão do cotovelo (62%). Contratura em supinação do antebraço (69%). Atitude em desvio ulnar do punho (27%). Diferentes tipos de paralisia dos dedos

Classificação do tipo proximal:

Classificação do tipo proximal:

- *Grupo I*: contratura de alguns grupos musculares com paralisia de outros (82%). Inclui: lesões do plexo braquial e lesões da articulação escapuloumeral, freqüentemente acompanhada de deformidade articular e luxação posterior e anterior da cabeça umeral, dos quais 17% apresentavam contratura em flexão de 20° a 30° no cotovelo, contratura em pronação do antebraço encontrada em 37% dos casos.
- *Grupo II*: paralisia flácida do ombro e do cotovelo (18%). Não há contratura muscular, comportamento semelhante à paralisia do adulto.
- *Grupo I*: este grupo se divide em quatro subgrupos de acordo com a condição da articulação escapuloumeral (congruência articular, subluxação ou luxação da cabeça umeral).
 - Subgrupo 1: (63%) – contratura em rotação interna e adução devido ao músculo súbescapular.
 - Subgrupo 2: (14%) – contratura em rotação externa e abdução devido ao infra-espinhoso e redondo menor. Clinicamente haverá elevação exagerada da escápula, *scapular winging*, à rotação interna máxima (mão na região lombar). Há tendência a luxação anterior da cabeça umeral.
 - Subgrupo 3: (3% a 4%) – combinação de contratura interna e externa.
 - Subgrupo 4: (1% a 6%) – contratura em abdução, devida ao supra-espinhoso.

Os subgrupos 1 e 2 são divididos em A e B de acordo com a congruência da articulação e possibilidade de subluxação da cabeça umeral.

A) Esfericidade e centralização da cabeça umeral preservados.

B) Deformidade e subluxação ou luxação posterior da cabeça umeral. Clinicamente com teste de Putti positivo: elevação da escápula à rotação externa e abdução passiva com o cotovelo em ângulo reto.

A) **Ombro** : as deformidades são classificadas de acordo com **Zancolli** em grupos e subgrupos :

-**grupo I(90%)**: contratura em rotação medial – adução s/ subluxação(subgrupo I) ou c/ subluxação posterior(subII); contratura em rot lateral-abdução c/ subluxação ou luxação antero-inferior(subIII) ; contratura de abdução pura(subIV).

A contratura em rotação medial e abdução é a mais comum e ocorre devido á paralisa dos músculos do manguito rotador(posterior) ,deltóide post e médio associado á contratura miostática do musc subescapular, peitoral maior, redondo maior e grande dorsal. O tipo A e B podem ser diferenciados entre si pelo sinal da elevação escapular **de Putti**(cotovelo fletido 90° + ombro aduzido e rodado lateralmente = se houver subluxação ou luxação posterior a borda supero-medial da clavícula se elevará).

Esta posição c/ o tempo leva à displasia glenoidal(alargamento e achatamento) c/ deslocamento da cabeça umeral . Posteriormente o acrômio vira-se p/ baixo e o processo coracóide alonga-se interpondo na articulação glenoumeral

A contratura em abdução – rotação lateral é causada pela fibrose e contratura do manguito posterior associado á abdução do ombro para compensar a limitação da rotação lateral . O sinal de Putti é positivo(devido á contratura muscular) só que a manobra é diferente(rotação medial + adução)

A contratura de abdução pura(raro) é causada pela contratura isolada do músculo supraespinhal com sinal de Putti positivo após a adução do ombro

- **grupo II**: corresponde á paralisa flácida pura s/ contratura muscular, subluxação ou luxação . Neste caso o sinal de Putti é negativo .

B) **Cotovelo** : desenvolve contratura em flexão devido á ação excessiva do bíceps e braquial . Dentre as alterações ósseas associadas destaca-se a hipertrofia do olécrano e processo coronóide. A luxação posterior da cabeça radial pode ocorrer se o membro acometido for imobilizado por longo tempo em flexão(contra-resistência do tríceps leva ao encurvamento da ulna alterando a articulação radioulnar proximal) e supinação(sofre contra-resistência do pronador redondo espástico) . Estas alterações aumentam a pressão da cabeça radial

contra o capítulo levando ao crescimento ósseo anormal culminando c/ “deformidade em baqueta de tambor”(achatamento e chanfradura anterior da epífise radial proximal)levando á luxação da cabeça radial.

C) **Antebraço e Mão:** deformidade em pronação(devido á paralisia dos supinadores) é a mais comum e se não corrigida pode levar também á luxação da cabeça radial. A deformidade em supinação ocorre devido á paralisia dos pronadores e o tracionamento do bíceps(que pode levar ao encurvamento do rádio ao redor da ulna assim como a luxação anterior da cabeça). **No Klumpke é que ocorre paralisia dos músculos da mão**

1) tipo IA: liberação da contratura miostática através do alongamento do subescapular e peitoral maior e aumento da força de rotação lateral do ombro através da transferência do redondo maior e grande dorsal para a diáfise umeral (Técnica de Sever-L’Episcopo modificada por Green).O Tchdjian recomenda a inserção do grande dorsal e redondo maior no manguito rotador.

2) tipo IB: osteotomia em rotação lateral do úmero. Esta técnica também pode ser indicada nos casos em que o redondo maior e grande dorsal estão paralisados mesmo s/ luxação glenoumeral .

3) tipo IC: alongamento do infraespinhal(atraves da interposição do redondo menor) e se houver incongruência articular realiza-se á osteotomia em rotação medial .

4) tipo ID: alongamento em Z do infraespinhal contraído

5) tipo II : A correção pode ser por 2 métodos de acordo com congruência articular.Nas crianças menores de 2 anos,a deformidade pode ser geral ser corrigida pelo alongamento por via posterior do infra-espinhoso e redondo menor,a cápsula posterior não é aberta, e lux anterior se ocorrer é corrigida com pela simples rotação interna.Crianças maiores podem ser submetidas a osteotomia de rot interna.

Se mesmo com a paralisia flácida houver sensibilidade na mão a flexão do cotovelo é obtida pela transferência do esternocleidomastóideo(**Técnica de Bunnel**) ou do peitoral maior (**Técnica de Clark**) . Se houver perda da sensibilidade da mão é recomendável a realização de uma amputação abaixo do cotovelo para uso de uma órtese funcional .

Waters - Recomenda que pacientes com lesões gleno-umerais grau I,II e III brando sejam submetidos a transferência posterior do grande dorsal e redondo maior para o manguito.Grau III,IV e V devem fazer osteotomia desrotacional

Cotovelo: O tto das seqüelas visa reestabelecer a flexão.O procedimento depende do grau de lesão e m.funcionantes.Pode fazer transferência do peitoral maior,tríceps e grande dorsal para o t.bíceps braquial..Após a maturação fisária podemos fazer a flexoplastia de Steinder.(transferência da m.flexo-pronadora junto com epicôndilo medial para posição mais proximal no úmero.).Pacientes até 4 anos – neurotização com parte do ulnar.

A **deformidade em supinação** - sem luxação da cabeça do rádio – cirurgia de Zancoli.(tenotomia em Z do t.bíceps passando a porção distal ao redor do rádio,suturando na porção proximal e invertendo a função do músculo(para pronador)

Se a **deformidade em flexão** for $> 40^{\circ}$ á 50° (sem resposta ao tratamento conservador com fisioterapia + imobilização em máxima extensão) indica-se a cirurgia(ressecção do processo olecraniano hipertrofiado + alongamento do braquial e do bíceps). Se houver luxação da cabeça radial detectada precocemente realiza-se sua redução mediante o encurtamento do rádio(em sua diáfise média). Se detectada tardiamente aguarda-se o término do crescimento e realiza a sua ressecção.

Antebraço :

Nas **contraturas em pronação** resistentes ao tratamento conservador(mobilização em supinação forçada + imobilização em supinação e flexão) recorre-se ao alongamento do pronador redondo com transferência do flexor ulnar do carpo para o radio distal(se a musculatura dorsoflexora estiver normal) ou para o extensor curto do carpo(se houver fraqueza na dorsoflexão do punho) .

Nas **contraturas em supinação** refratárias ao tratamento conservador realiza-se a transferência do tendão do bíceps braquial para o lado lateral do radio.

Sob o ponto de vista cirúrgico Zancolli classifica em dois tipos:

- I. Atitude em supinação – sem retração da membrana interóssea, tratada por *rerouting* do tendão do bíceps com alongamento em Z, passando a porção distal em torno do rádio suturando na porção proximal para transformar o músculo em pronador em vez de supinador (fig. 24-11).
- II. Com retração da membrana interóssea, apresenta gradações distintas, de acordo com a condição do tríceps e das articulações radioulnar distal e proximal.

Se houver bom tríceps com a radioulnar distal normal realizar liberação da membrana interóssea e *rerouting* do bíceps. Se houver insuficiência do tríceps ou subluxação da ulna distal e, com maior gravidade, repercussão proximal com luxação da cabeça do rádio, o tratamento terá que ser modificado.

(Manske recomenda osteoclasia percutânea dos ossos do antebraço, para evitar procedimentos extensivos de partes moles.)

Bibliografia – Santili - ortopedia pediátrica, Campbell – vol2, Lesões nervosas e periféricas, anatomia de Fatini